




Diagnose

DICER1 syndroom

De erfelijke aandoening DICER1 syndroom geeft een verhoogde kans op verschillende tumoren. Meestal zijn deze goedaardig, maar soms gaat het om kanker. Het betreft dan vooral kinderen en jongeren. Niet iedereen met dit syndroom heeft dezelfde verschijnselen. Longcysten en multinodulair struma zijn veelvoorkomende verschijnselen van DICER1 syndroom.

Dit kaartje is gebaseerd op de kennis die we nu hebben. We geven informatie over klachten die kunnen wijzen op een DICER1-gerelateerde tumor. Als jij of je kind deze klachten hebt/heeft, adviseren we je om naar de huisarts te gaan. De klachten kunnen ook een andere oorzaak hebben. Je huisarts kan dit beoordelen.



Mogelijke symptomen DICER1-gerelateerde tumoren

De meeste DICER1-gerelateerde tumoren komen voor bij kinderen en jongeren. Symptomen van tumoren die ook op volwassen leeftijd voorkomen zijn gemarkeerd (zie*).

Hoofd		• langdurige hoofdpijn • problemen met lopen/balans • slechter zien, dubbel zien, veranderd oogbewegen	• langdurig verstopte neus, pus uit de neus, bloedneus • stuipen • overgeven
Schildklier*		• voelbare of zichtbare knobbel(s) in de hals (waar de schildklier zit) of voelbaar vergrote lymfeklieren	• hese of schorre stem en/of hoest die niet overgaat • moeite met slikken • pijn in de hals
Longen		• snel ademen (in rust) • pijn op de borst	• hoest die niet overgaat • pijn bij het ademen
Nieren		• zwelling en/of pijn in de buik of zij • bloed in de urine	
Eierstokken*		• opgeblazen, bolle buik en/of buikpijn • puistjes, veranderde stem, meer beharing • vroege puberteit (vóór de leeftijd van 8 jaar) • vaginaal bloedverlies terwijl je niet ongesteld bent • onregelmatig of niet meer ongesteld zijn	
Algemeen*		• afvallen of aankomen zonder duidelijke reden • langdurig moe zijn zonder duidelijke reden • verdikking/knobbel(tje)s ergens in je lichaam	
